

# ARGICAL PRO

## Fiche d'identité

Nom commercial : **ARGICAL PRO**

Composition : **ARGILE KAOLINIQUE  
NATURELLE CALCINEE 990 g/kg**

N° AMM : **2120158**

Type d'action : **INSECTICIDES**

Formulation : **(WP) POUDRE MOUILLABLE**

Conditionnement : **20kg**

Argical® Pro, bio-insecticide qui crée une barrière minérale protectrice sur les cultures, repoussant les ravageurs et protégeant contre les coups de soleil. Sans résistances, ni LMR/DRE, ce produit 100% naturel assure qualité et tranquillité d'esprit. IL est autorisé en vigne contre la cicadelle verte et en arboriculture sur de nombreux ravageurs.



## Usages autorisés

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          | Dose     | Max. appli | DAR | ZNT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|-----|-----|
| Abricotier                                                                                                                                                                                                                                                | Trt Part.Aer. | Pucerons | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.<br>Dose :<br>Applications :<br>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha. |               |          |          |            |     |     |
| Cerisier                                                                                                                                                                                                                                                  | Trt Part.Aer. | Mouches  | 50 KG/HA | 1          |     | 5 m |
| Usage :<br>Stade d'applicatin: début de la véraison.<br>Dose :                                                                                                                                                                                            |               |          |          |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ARGICAL PRO

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            | Dose     | Max. appli | DAR | ZNT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------|-----|-----|
| Cerisier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trt Part.Aer. | Pucerons   | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Intervalle entre les applications: 21 jours</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha. 5 applications maximum par an et par culture pour contrôler l'ensemble des ravageurs.</p> |               |            |          |            |     |     |
| Citronnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Trt Part.Aer. | Cicadelles | 50 KG/HA | 5          | 1   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur cicadelles.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                                                          |               |            |          |            |     |     |
| Clémentinier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trt Part.Aer. | Cicadelles | 50 KG/HA | 5          | 1   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur cicadelles.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                                                          |               |            |          |            |     |     |
| Cognassiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trt Part.Aer. | Pucerons   | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur pommier, cognassier et nashi.Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                 |               |            |          |            |     |     |
| Jujubier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trt Part.Aer. | Pucerons   | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                                                             |               |            |          |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ARGICAL PRO

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            | Dose     | Max. appli | DAR | ZNT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|------------|-----|-----|
| Limettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trt Part.Aer. | Cicadelles | 50 KG/HA | 5          | 1   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur cicadelles.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                          |               |            |          |            |     |     |
| Mandarinier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trt Part.Aer. | Cicadelles | 50 KG/HA | 5          | 1   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur cicadelles.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                          |               |            |          |            |     |     |
| Mirabellier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trt Part.Aer. | Pucerons   | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                             |               |            |          |            |     |     |
| Nashi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trt Part.Aer. | Pucerons   | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur pommier, cognassier et nashi.Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p> |               |            |          |            |     |     |
| Nectarinier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trt Part.Aer. | Pucerons   | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                             |               |            |          |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ARGICAL PRO

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    | Dose     | Max. appli | DAR | ZNT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------|-----|-----|
| Olivier                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trt Part.Aer. | Mouches de l'olive | 30 KG/HA | 6          | 28  | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Stade d'application: Début des pontes de chaque génération ou pics de vols.Intervalle entre les applications: la cadence de 14 jours est à privilégier sous forte pression.</p> <p>Dose :</p>                                                                                        |               |                    |          |            |     |     |
| Oranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trt Part.Aer. | Cicadelles         | 50 KG/HA | 5          | 1   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur cicadelles.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                    |               |                    |          |            |     |     |
| Pamplemoussier                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trt Part.Aer. | Cicadelles         | 50 KG/HA | 5          | 1   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur cicadelles.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                    |               |                    |          |            |     |     |
| Pêcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Trt Part.Aer. | Pucerons           | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                       |               |                    |          |            |     |     |
| Poirier                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trt Part.Aer. | Psylle             | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur poirier.Intervalle minimum entre les applications: 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p> |               |                    |          |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ARGICAL PRO

| Culture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                         | Dose     | Max. appli | DAR | ZNT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------|------------|-----|-----|
| Pommier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trt Part.Aer. | Pucerons                | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Uniquement sur pommier, cognassier et nashi.Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p> |               |                         |          |            |     |     |
| Prunier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trt Part.Aer. | Pucerons                | 50 KG/HA | 5          | F   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Intervalle minimum entre les applications : 21 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>Première application à la dose maximale de 50 kg/ha (après la récolte des fruits) suivie, au plus, de quatre applications à la dose maximale de 30 kg/ha.</p>                                             |               |                         |          |            |     |     |
| Vigne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Trt Part.Aer. | Cicadelle des grillures | 20 KG/HA | 6          | 3   | 5 m |
| <p>Usage :</p> <p>Efficacité montrée sur Empoasca vitis.Intervalle minimum entre les applications : 3 jours.</p> <p>Dose :</p> <p>Applications :</p> <p>1ère application au début du vol des cibles.</p>                                                                                                                     |               |                         |          |            |     |     |

## Description

## Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

## Informations réglementaires

Nom commercial : ARGICAL PRO

-

Mention d’avertissement :

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d’éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ARGICAL PRO

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention de danger :            | EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conseils de prudence :         | <p>SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.</p> <p>SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages Olivier*Trt Part.Aer.*Mouche de l'olive et Cerisier*Trt Part.Aer.*Mouches des fruits.Pour protéger les arthropodes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente pour les usages en arboriculture.</p> <p>SPe 8 Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer sur les cultures en période de floraison. Ne pas appliquer en présence d'abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs.</p> |
| DRE                            | 6h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Détenteur homologation :       | AGS Mineraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marque déposée :               | IMERYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Réglementation transport ADR : | VOIR FDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**