

# ATTENTO

## Fiche d'identité

Nom commercial : **ATTENTO**

Composition : **TETRACONAZOLE 125 g/L**

N° AMM : **9000741**

Type d'action : **FONGICIDES**

Formulation : **(ME) MICRO EMULSION**

Conditionnement : **5L**

Fongicide pour lutter contre les principales maladies de la betterave (cercosporiose, ramulariose, oïdium, rouille). Idéal en 1ère intervention économique !



## Usages autorisés

| Culture                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                             | Dose     | Max. appli | DAR      | ZNT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|-----|
| Betterave fourragère                                                                                                                                                                                                                           | Trt Part.Aer. | Oïdium, Ramulariose, Rouille, Cercosporiose | 0,8 L/HA | 1          | 14 jours | 5 m |
| Usage :<br>Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison des betteraves industrielles et fourragères et ne pas utiliser sur les zones de butinage.<br>Dose : |               |                                             |          |            |          |     |
| Betterave industrielle                                                                                                                                                                                                                         | Trt Part.Aer. | Oïdium, Ramulariose, Rouille, Cercosporiose | 0,8 L/HA | 1          | 14 jours | 5 m |
| Usage :<br>Dangereux pour les abeilles. Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la floraison des betteraves industrielles et fourragères et ne pas utiliser sur les zones de butinage.<br>Dose : |               |                                             |          |            |          |     |
| Blé dur d'hiver                                                                                                                                                                                                                                | Trt Part.Aer. | Oïdium                                      | 1 L/HA   | 1          | F        | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies                                                                                                                                        |               |                                             |          |            |          |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



# ATTENTO

| Culture                                                                                                 |               |                              | Dose   | Max. appli | DAR | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------|-----|-----|
| Blé dur d'hiver                                                                                         | Trt Part.Aer. | Septoriose                   | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé dur d'hiver                                                                                         | Trt Part.Aer. | Rouille brune, Rouille jaune | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé dur d'hiver                                                                                         | Trt Part.Aer. | Helminthosporiose            | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé dur de printemps                                                                                    | Trt Part.Aer. | Helminthosporiose            | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé dur de printemps                                                                                    | Trt Part.Aer. | Oïdium                       | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé dur de printemps                                                                                    | Trt Part.Aer. | Septoriose                   | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ATTENTO

| Culture                                                                                                 |               |                              | Dose   | Max. appli | DAR | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------|-----|-----|
| Blé dur de printemps                                                                                    | Trt Part.Aer. | Rouille brune, Rouille jaune | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre d'hiver                                                                                      | Trt Part.Aer. | Helminthosporiose            | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre d'hiver                                                                                      | Trt Part.Aer. | Septoriose                   | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre d'hiver                                                                                      | Trt Part.Aer. | Oïdium                       | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre d'hiver                                                                                      | Trt Part.Aer. | Rouille brune, Rouille jaune | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre de printemps                                                                                 | Trt Part.Aer. | Septoriose                   | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



# ATTENTO

| Culture                                                                                                 |               |                              | Dose   | Max. appli | DAR | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------|-----|-----|
| Blé tendre de printemps                                                                                 | Trt Part.Aer. | Oïdium                       | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre de printemps                                                                                 | Trt Part.Aer. | Rouille brune, Rouille jaune | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Blé tendre de printemps                                                                                 | Trt Part.Aer. | Helminthosporiose            | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Epeautre                                                                                                | Trt Part.Aer. | Rouille brune, Rouille jaune | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Epeautre                                                                                                | Trt Part.Aer. | Helminthosporiose            | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Epeautre                                                                                                | Trt Part.Aer. | Septoriose                   | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ATTENTO

| Culture                                                                                                 |               |                              | Dose   | Max. appli | DAR | ZNT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------|------------|-----|-----|
| Epeautre                                                                                                | Trt Part.Aer. | Oïdium                       | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Triticale                                                                                               | Trt Part.Aer. | Septoriose                   | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Triticale                                                                                               | Trt Part.Aer. | Oïdium                       | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Triticale                                                                                               | Trt Part.Aer. | Rouille brune, Rouille jaune | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |
| Triticale                                                                                               | Trt Part.Aer. | Helminthosporiose            | 1 L/HA | 1          | F   | 5 m |
| Usage :<br>Dose :<br>Applications :<br>1 application par culture sur l'ensemble du complexe de maladies |               |                              |        |            |     |     |

## Description

### Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ATTENTO

## Informations réglementaires

Nom commercial :

ATTENTO



Mention d'avertissement :

Mention de danger :

**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

**P391** Recueillir le produit répandu.  
**P501** Éliminer le contenu/récipient dans des sacs étanches conformément à la réglementation locale ou dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**SP 1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]  
**SPe 3** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

DRE

6h

Détenteur homologation :

GOWAN

Marque déposée :

ISAGRO

Réglementation transport ADR :

VOIR FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**