BAROUD SC

Fiche d'identité

Nom commercial : **BAROUD SC**

Composition : **PENDIMETHALIN 400 g/L**

N° AMM : **2030404**

Type d’action : **HERBICIDES**

Formulation : **(SC) SUSPENSION CONCENTREE**

Conditionnement :

BAROUD SC est un herbicide sélectif à base de pendiméthaline recommandé pour lutter contre les dicotylédones et les graminées adventices annuelles.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Ail	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu’elle n’est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Aneth	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des feuilles. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Aneth (graines)	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	90 jours	20 m
Usage : Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des graines. Dose :						
Aneth porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Angélique	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur onagre et sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de racines. Dose :						
Angélique	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	42 jours	50 m
Usage : Uniquement sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de feuilles.L'usage sur sauge officinale est refusé au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit. Dose :						
Aubergines	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement en pré-plantation Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Blé dur d'hiver	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur blé et triticale. Dose :						
Blé dur de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur blé et triticale. Dose :						
Blé tendre d'hiver	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur blé et triticale. Dose :						
Blé tendre de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur blé et triticale. Dose :						
Bleuet	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur bleuet, chardon-marie, millepertuis perforé et pyrèthre de Dalmatie.L'usage est refusé sur artichaut, cardon, bardane, cosmos, échinacée, garance et valériane au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit sur ces cultures. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Carotte	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Carotte porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Céleri branche	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Céleri porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Céleri rave	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Cerfeuil	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des feuilles. Dose :						
Cerfeuil (graines)	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	90 jours	20 m
Usage : Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des graines. Dose :						
Cerfeuil porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chardon Marie	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur bleuet, chardon-marie, millepertuis perforé et pyrèthre de Dalmatie.L'usage est refusé sur artichaut, cardon, bardane, cosmos, échinacée, garance et valériane au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit sur ces cultures. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Chicorée bisannuelle porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Choux à inflorescence	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement en pré-plantation. Dose :						
Choux feuilles	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement en pré-plantation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux pommés	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement en pré-plantation. Dose :						
Choux porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Choux-raves	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement en pré-plantation. Dose :						
Ciboulette	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	42 jours	20 m
Usage : Uniquement sur ciboulette. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Ciboulette porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Citrouille porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur coloquinte, courgette, citrouille, oignon et potiron.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Coloquinte porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur coloquinte, courgette, citrouille, oignon et potiron.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Concombres porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur concombre, cornichon et melon.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Coriandre	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des feuilles. Dose :						
Coriandre (graine)	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	90 jours	20 m
Usage : Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des graines. Dose :						
Coriandre porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Cornichons porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur concombre, cornichon et melon.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Courgettes porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur coloquinte, courgette, citrouille, oignon et potiron.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Echalotes	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Echalotes porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Fenouil	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Fenouil porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Fève fraîche	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur fève fraîche.La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Fève porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur graminées porte-graine fourragère, fève et luzerne.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Féverole de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur les cultures de printemps de féveroles, de pois protéagineux et de lupin.L'usage est retiré sur les cultures d'hiver à la dose de 3 L/ha au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Gaude	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur pavot de Californie et gaude.La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Graminées fourragères porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur graminées porte-graine fourragère, fève et luzerne.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Haricot porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Livèche	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur onagre et sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de racines. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Livèche	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	42 jours	50 m
Usage : Uniquement sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de feuilles.L'usage sur sauge officinale est refusé au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit. Dose :						
Lupin de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur les cultures de printemps de féveroles, de pois protéagineux et de lupin.L'usage est retiré sur les cultures d'hiver à la dose de 3 L/ha au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Lupin vivace porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Luzerne porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur graminées porte-graine fourragère, fève et luzerne.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Luzerne porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Maïs ensilage	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	4 L/HA	1	F*	20 m
Usage : Dose :						
Maïs fourrage	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	4 L/HA	1	F*	20 m
Usage : Dose :						
Maïs grain	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	4 L/HA	1	F*	20 m
Usage : Dose :						
Melons	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur melon et potiron. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Melons porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	0,8 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur concombre, cornichon et melon.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Millepertuis perforé	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur bleuet, chardon-marie, millepertuis perforé et pyrèthre de Dalmatie.L'usage est refusé sur artichaut, cardon, bardane, cosmos, échinacée, garance et valériane au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit sur ces cultures. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Millet	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F*	20 m
Usage : Dose :						
Miscanthus	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F*	20 m
Usage : Dose :						
Moha	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F*	20 m
Usage : Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Muguet	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur Muguet. Dose :						
Oignons	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Oignons porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur coloquinte, courgette, citrouille, oignon et potiron.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Onagre	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur onagre et sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de racines. Dose :						
Orge d'hiver	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Orge de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Dose :						
Origan	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur origan, romarin, sarriette vivace en culture installée après coupe.L'usage est refusé sur souci et thym au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit. Dose :						
Panais	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Panais porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Pavot de californie	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur pavot de Californie et gaude.La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Persil	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,25 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur persil. Dose :						
Persil à grosse racine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Persil porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Poireaux	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3,3 L/HA	1	70 jours	20 m
Usage : Application en pré-plantation Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Poireaux porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Pois chiche de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur cultures de printemps de pois-chiche.L'usage est retiré sur les cultures d'hiver à la dose de 3 L/ha au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines. Dose :						
Pois de senteur porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Pois écossés frais	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur pois écossés frais.La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois protéagineux de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur les cultures de printemps de féveroles, de pois protéagineux et de lupin.L'usage est retiré sur les cultures d'hiver à la dose de 3 L/ha au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Potiron	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur melon et potiron. Dose :						
Potiron porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur coloquinte, courgette, citrouille, oignon et potiron.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Pyrèthre de Dalmatie	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement sur bleuet, chardon-marie, millepertuis perforé et pyrèthre de Dalmatie.L'usage est refusé sur artichaut, cardon, bardane, cosmos, échinacée, garance et valériane au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit sur ces cultures. La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Reine marguerite porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Rhubarbe	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Romarin	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur origan, romarin, sarriette vivace en culture installée après coupe.L'usage est refusé sur souci et thym au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit. Dose :						
Sainfoin porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Salsifis	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Sariette vivace	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	28 jours	20 m
Usage : Uniquement sur origan, romarin, sarriette vivace en culture installée après coupe.L'usage est refusé sur souci et thym au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit. Dose :						
Scorsonères	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2 L/HA	1	F	20 m
Usage : La possibilité de fractionnement de la dose est refusée au motif qu'elle n'est pas autorisée pour le produit de référence, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. Dose :						
Seigle d'hiver	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Dose :						
Seigle de printemps	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Soja	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur soja.L'usage sur arachide est retiré au motif qu'il n'est pas autorisé pour le produit de référence car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque de dépassement de la limite maximale de résidus. Dose :						
Sorgho ensilage	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	120 jours	20 m
Usage : Application en pré-levée et post-levée précoce. Dose :						
Sorgho fourrage	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	120 jours	20 m
Usage : Application en pré-levée et post-levée précoce. Dose :						
Sorgho grain	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	120 jours	20 m
Usage : Application en pré-levée et post-levée précoce. Dose :						
Tabac	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	NC	50 m
Usage : Uniquement en pré plantation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Tomates	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement en pré-plantation Dose :						
Tournesol	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	3 L/HA	1	F	50 m
Usage : Dose :						
Trèfle blanc porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Trèfle incarnat porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Trèfle violet porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						
Triticale	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	2,5 L/HA	1	F	50 m
Usage : Uniquement sur blé et triticale. Dose :						
Vesce de printemps porte-graine	Désherbage	Dicotylédones annuelles, Graminées annuelles	1,5 L/HA	1	NC	20 m
Usage : Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.Avant l'utilisation de BAROUD SC sur les cultures porte-graines, il est impératif de contacter le service technique de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) ou tout autre organismes semenciers pour préciser les conditions d'utilisation. Dose :						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial : **BAROUD SC**

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC



Mention d'avertissement :	**Attention**
Mention de danger :	**EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.** **EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.** **H361d Susceptible nuire au foetus** **H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.** **H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**
Conseils de prudence :	**P201 Se procurer les instructions avant utilisation.** **P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.** **P391 Recueillir le produit répandu.** **P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.** **P501 Eliminer le contenu/récipient dans des sacs étanches conformément à la réglementation locale ou un point de collecte des déchets agrée.** **SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]** **SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés pour les usages « choux », « oignon » « PPAM » et sur onagre, angélique, livèche.** **SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur « blé », « choux », « cultures florales et plantes vertes », « graines protéagineuses », « légumineuses potagères », « cucurbitacées à peau non comestible », « oignon », « orge », « haricots et pois écossés frais », « seigle », « soja », « tabac », « tomate », « tournesol » « PPAM - non alimentaires » et pour les applications à une dose d'emploi supérieure à 2 L/ha sur « porte graine » et sur « PPAMC ».Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur « carotte » et « céleri-branche » et pour les applications à une dose d'emploi supérieure à 1**

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



BAROUD SC

	L/ha et inférieure ou égale à 2 L/ha sur « porte graine » et « PPAMC ».Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les applications à une dose d'emploi inférieure ou égale à 1 L/ha sur « porte graine » et « PPAMC ».
DRE	**48h**
Détenteur homologation :	**SIPCAM France**
Marque déposée :	**SIPCAM France**
Réglementation transport ADR :	**VOIR FDS**

EUH208 Contient de la pendiméthaline et 1,2 benzisothiazole-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H361d Susceptible nuire au foetus
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.