

# BISMARCK CS

## Fiche d'identité

Nom commercial : **BISMARCK CS**

Composition : **CLOMAZONE 55 g/L**  
**PENDIMETHALIN 275 g/L**

N° AMM : **2210011**

Type d'action : **HERBICIDES**

Formulation : **(CS) SUSPENSION DE CAPSULES**

Conditionnement : **5L**

Bismark CS est un herbicide multicultures composé de 55g/L de clomazone et de 275 g/L de pendiméthaline. Homologué sur de nombreuses cultures dont les graines protéagineuses, les haricots, la pomme de terre, le colza et le soja. Bismark CS présente un large spectre d'action (dicotylédones et graminées) grâce à l'association de 2 matières actives complémentaires.



## Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Colza d'hiver	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	1,5 L/HA	1	F	5 m

Usage :  
Application d'août à septembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation humaine ou animale. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : - l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement - l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.

Dose :

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Colza d'hiver	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	1,5 L/HA	1	F	5 m
<p>Usage :</p> <p>Application d'aout à septembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Fève	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Fève	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Féverole d'hiver	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Féverole de printemps	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Féverole porte-graine	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Fèves sèches	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Fèves sèches	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Flageolet	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Haricots frais écosés	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Haricots non écosés	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Haricots non écosés frais	Dés herbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Haricots secs	Dés herbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Haricots secs	Dés herbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Lupin	Dés herbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Lupin porte-graine	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m

Usage :  
Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.

Dose :

Pois écosés frais	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
-------------------	------------	-----------------------------	--------	---	---	------

Usage :  
Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.

Dose :

Pois écosés frais	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
-------------------	------------	-----------------------------	--------	---	---	------

Usage :  
Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.

Dose :

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois fourrager	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Pois fourrager	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Pois non écosés	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Pois non écosés frais	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois proteagineux	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.</p> <p>Dose :</p>						
Pois protéagineux d'hiver	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Pois protéagineux de printemps	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						
Pois sec	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
<p>Usage :</p> <p>Application de mars à novembre. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.</p> <p>Dose :</p>						

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois sec	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m

Usage :  
Application de mars à novembre. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit. humaine ou animale.

Dose :

Pommes de terre	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
-----------------	------------	-----------------------------	--------	---	---	------

Usage :  
Application de février à mai. Ne pas utiliser les sous produits des cultures porte-graines en alimentation humaine ou animale. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.

Dose :

Pommes de terre	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2 L/HA	1	F	20 m
-----------------	------------	-----------------------------	--------	---	---	------

Usage :  
Application de février à mai. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :-l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.

Dose :

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
 EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
 H361d Susceptible nuire au fœtus  
 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Soja	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2,5 L/HA	1	F	20 m

Usage :  
Application d'avril à juin. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : -l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.

Dose :

Soja	Désherbage	Dicotylédones, Graminées	2,5 L/HA	1	F	20 m
------	------------	-----------------------------	----------	---	---	------

Usage :  
Application d'avril à juin. Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture) afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air. Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : -l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents. En cas d'échec cultural, ne pas implanter de culture à cycle de croissance court dans la parcelle traitée moins de 90 jours après une application du produit.

Dose :

## Description

## Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

## Informations réglementaires

Nom commercial :

**BISMARK CS**



Mention d'avertissement :

**Attention**

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H361d Susceptible nuire au fœtus  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# BISMARK CS

Mention de danger :

**EUH208** Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique

**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

**H361d** Susceptible nuire au fœtus

**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

**P261** Éviter de respirer les brouillards/vapeurs.

**P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**P391** Recueillir le produit répandu.

**P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P308+P313** EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

**P337+P313** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**SP 1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

**SPe 3** Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages "pomme de terre", "soja", "graines protéagineuses", "pois écosés frais", "haricots écosés frais", "haricots et pois non écosés frais", "légumineuses potagères", porte-graine de pomme de terre, soja, pois protéagineux, pois fourrager, féveroles, lupin et autres graines protéagineuses, pois écosés frais, haricots écosés frais, fève, haricots et pois non écosés frais, fèves sèches, haricots secs et pois secs. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les usages "crucifères oléagineuses" et porte-graine de colza.

DRE

48h

Détenteur homologation :

SIPCAM OXON SPA

Marque déposée :

SIPCAM OXON SPA

Réglementation transport ADR :

VOIR FDS

**EUH208** Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique  
**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.  
**H361d** Susceptible nuire au fœtus  
**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**