ERCOLE

Fiche d'identité

Nom commercial : **ERCOLE**

Composition : **LAMBDA-CYHALOTHRIN 4 g/kg**

N° AMM : **2150483**

Type d’action : **INSECTICIDES**

Formulation : **(GR) GRANULE**

Conditionnement : **10kg**

ERCOLE® est un insecticide du sol muticultures à base de lambda-cyhalothrine. ERCOLE® est formulé en microgranulés prêts à l’emploi. Il doit être positionné dans la raie de semis à l’aide d’un microgranulateur fixé sur le semoir. ERCOLE® combine 3 modes d’action : contact, ingestion et tension de vapeur.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Ail	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.
Dose :

EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Aubergines - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Autres cucurbitacées à peau comestible	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Autres cucurbitacées à peau non comestible	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Betterave fourragère	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave industrielle	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Dose :						
Betterave potagère	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Dose :						
Brocolis	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Bulbes ornementaux	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Carotte	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Céleri rave	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Chicorée scarole	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation et/ou de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chicorée-frisée	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation et/ou de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Choux de bruxelles	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Choux feuilles	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux pommés	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Choux-fleurs	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Choux-raves	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Concombres	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Cornichons	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Courgettes	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Cultures ornementales	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1		NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Echalotes	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Dose :						
Laitue	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation et/ou de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Mâche	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation et/ou de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Maïs	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Maïs doux	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Melons	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Millet	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Miscanthus	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Moha	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Oignons	Trt Sol	Taupins	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Appliquer la préparation dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Dose :						
Panais	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Pastèques	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Persil à grosse racine	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Piments - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Poivrons - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Pommes de terre	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Porte graine . Potagères, PPAMC et florales	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Potiron	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Raifort	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Roquette	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation et/ou de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Scorsonères	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Soja	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Sorgho	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier. Dose :						
Tabac	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Tomates - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de plantation.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Topinambours	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						
Tournesol	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
Usage : Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur.Uniquement en plein champ.Application dans la raie de semis.Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Application uniquement avec un épandeur mécanisé.Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Dose :						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial : **ERCOLE**



EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ERCOLE

Mention d'avertissement :	**Attention**
Mention de danger :	**EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.** **H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.**
Conseils de prudence :	**P102 Tenir hors de portée des enfants.** **P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.** **P273 Éviter le rejet dans l'environnement.** **P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation.** **P391 Recueillir le produit répandu.** **P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.** **SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]** **SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm.Pour protéger les organismes aquatiques, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 5 cm pour "betterave" et "oignon".** **SPe 5 Pour protéger les oiseaux, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol** **s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons.** **SPe 6 Pour protéger les oiseaux, récupérer tout produit accidentellement répandu.**
DRE	**Non Concerné**
Détenteur homologation :	**SIPCAM OXON SPA**
Marque déposée :	**SIPCAM OXON SPA**
Réglementation transport ADR :	**VOIR FDS**

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

