

# ERCOLE

## Fiche d'identité

Nom commercial : **ERCOLE**

Composition : **LAMBDA-CYHALOTHRIN 4 g/kg**

N° AMM : **2150483**

Type d'action : **INSECTICIDES**

Formulation : **(GR) GRANULE**

Conditionnement : **10kg**

ERCOLE® est un insecticide du sol muticultures à base de lambda-cyhalothrine. ERCOLE® est formulé en microgranulés prêts à l'emploi. Il doit être positionné dans la raie de semis à l'aide d'un microgranulateur fixé sur le semoir. ERCOLE® combine 3 modes d'action : contact, ingestion et tension de vapeur.



## Usages autorisés

Culture		Dose	Max. appli	DAR	ZNT	
Aubergines - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hanneçons	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres cucurbitacées à peau comestible	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Autres cucurbitacées à peau non comestible	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Brocolis	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Carotte	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Céleri rave	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Chicorée scarole	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chicorée-frisée	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Choux de bruxelles	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Choux feuilles	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux pommés	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Choux-fleurs	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
--------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Choux-raves	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
-------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Concombres	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Cornichons	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

Courgettes	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
------------	---------	--	----------	---	---	----

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Cultures ornementales	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1		NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Laitue	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Mâche	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Maïs	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.</p> <p>Dose :</p>						
Maïs doux	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Melons	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Millet	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.

Dose :

Miscanthus	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
------------	---------	---	----------	---	---	----

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.

Dose :

Moha	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
------	---------	---	----------	---	---	----

Usage :  
Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.

Dose :

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Panais	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Pastèques	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Persil à grosse racine	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Piments - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Poivrons - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Pommes de terre	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Porte graine . Potagères, PPAMC et florales	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Potiron	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Raifort	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Roquette	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Scorsonères	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Soja	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Sorgho	Trt Sol	Scutigérelle, Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004. Utilisation possible sur maïs semences. Suivre les recommandations de l'obtenteur, de l'organisme semencier.</p> <p>Dose :</p>						
Tabac	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Tomates - plein champ	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de plantation. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Topinambours	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						
Tournesol	Trt Sol	Taupins, Vers gris - Noctuelles, Chrysomèle (Diabrotica Virgifera), Hannetons	15 KG/HA	1	F	NC
<p>Usage :</p> <p>Zone Non Traité aquatique 5 mètres selon la réglementation en vigueur. Uniquement en plein champ. Application dans la raie de semis. Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. Application uniquement avec un épandeur mécanisé. Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graines traitées en alimentation humaine ou animale. Le produit contenant de la lambda-cyhalothrine, susceptible de provoquer des paresthésies, il conviendra d'éviter le contact avec la peau conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004.</p> <p>Dose :</p>						

## Description

## Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

## Informations réglementaires

Nom commercial :

**ERCOLE**



EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# ERCOLE

Mention d'avertissement :	<b>Attention</b>
Mention de danger :	<b>EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</b>
Conseils de prudence :	<b>P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.</b>  <b>SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol à une profondeur minimum de 4 cm. SPe 5 Pour protéger les oiseaux, le produit doit être entièrement incorporé dans le sol s'assurer que le produit est également incorporé en bout de sillons. SPe 6 Pour protéger les oiseaux, récupérer tout produit accidentellement répandu.</b>
DRE	<b>Non Concerné</b>
Détenteur homologation :	<b>SIPCAM OXON SPA</b>
Marque déposée :	<b>SIPCAM OXON SPA</b>
Réglementation transport ADR :	<b>VOIR FDS</b>

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.  
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**