

KULTO

Fiche d'identité

Nom commercial : **KULTO**

Composition : **BACILLUS SUBTILIS SOUCHE IAB/BS03 100000000 cfu/mL**

N° AMM : **2220430**

Type d'action : **FONGICIDES**

Formulation : **(SC) SUSPENSION CONCENTREE**

Conditionnement : **5L**

Kulto® est une solution de biocontrôle à large spectre utilisable en vigne, cultures légumières et arboriculture. Cette spécialité de biocontrôle KULTO est composée d'une nouvelle souche de Bacillus Subtilis et d'une formulation brevetée exclusive. Cette formulation brevetée "BOOST" lui garantit une excellente stabilité et est parfaitement compatible avec d'autres produits. En vigne, Kulto est homologué contre le Botrytis.



Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Amandier	Trt Part.Aer.	Tavelure, Polystigma	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur. Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Angélique	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur. Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours. 5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Angélique	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Artichauts	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Aubergines	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Autres choux feuillus	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres cucurbitacées à peau comestible	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Autres cucurbitacées à peau non comestible	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et PPAM non alimentaires	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Autres salades	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Autres salades	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Brocolis	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclerotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Cardons	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Carvi (feuille)	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclerotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Carvi (feuille)	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Céleri branche	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Céleri rave	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Chicorée scarole	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Chicorée scarole	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chicorée-frisée	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Chicorée-frisée	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Chou vert	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Choux à inflorescence	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux de bruxelles	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Choux de chine	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Choux feuilles	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Choux pommés	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Choux-fleurs	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Choux-raves	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Cognassiers	Trt Part.Aer.	Tavelure	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Concombres	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Cornichons	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Courgettes	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Cresson alénois	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Cresson de fontaine	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Fenouil	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Fenouil	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Laitue	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Laitue	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Mâche	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Mâche	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Melons	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Nashi	Trt Part.Aer.	Tavelure	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Néflier	Trt Part.Aer.	Tavelure	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Pastèques	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Plantes alliacées dont ciboulette	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Plantes alliacées dont ciboulette	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Plantes apiacées dont aneth, persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Plantes apiacées dont aneth, persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Plantes astéracées dont estragon, stevia	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Plantes astéracées dont estragon, stevia	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Plantes lamiacées dont basilic, thym, sauge, sarriette, origan, marjolaine, hysope, menthe	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Plantes lamiacées dont basilic, thym, sauge, sarriette, origan, marjolaine, hysope, menthe	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Poirier	Trt Part.Aer.	Tavelure	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Poivrons	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pommette	Trt Part.Aer.	Tavelure	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Pommier	Trt Part.Aer.	Tavelure	3 L/HA	7	3 jours	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Potiron	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Rhubarbe	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Roquette	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Roquette	Trt Part.Aer.	Mildiou	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.5 applications maximum par an et par culture.						
Tabac	Trt Part.Aer.	Oïdium	3 L/HA	5	NC	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Tomates	Trt Part.Aer.	Pourriture grise, Sclérotiniose	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Également autorisé sous abri.Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Vigne	Trt Part.Aer.	Pourriture grise	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						
Vigne - raisin de cuve	Trt Part.Aer.	Pourriture grise	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur.Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Vigne - raisin de table	Trt Part.Aer.	Pourriture grise	3 L/HA	5	1 jour	5 m
Usage : Ne doit pas être utilisé par des personnes fortement immunodéprimées ou sous traitement immunosuppresseur. Contient du Bacillus subtilis. Peut provoquer des réactions de sensibilisation. Dose : Applications : Intervalle minimum entre les applications : 5 jours.						

Description

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial :	KULTO
	NC
Mention d'avertissement :	
Mention de danger :	EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
Conseils de prudence :	P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage pendant toutes les étapes de manipulation de la préparation. P501 Éliminer le contenu/récipient dans des sacs étanches conformément à la réglementation locale ou dans une installation d'élimination des déchets agréée. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.] SPe 2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas rejeter les eaux usées des serres hors sol directement dans les eaux de surface. SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

KULTO

non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau pour les usages en plein champ et sous tunnel ouvert au moment du traitement.

DRE	6h à l'extérieur et 8h en milieu fermé
Détenteur homologation :	SEIPASA SA
Marque déposée :	SEIPASA
Réglementation transport ADR :	VOIR FDS

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**