OGIVE VXT

Fiche d'identité

Nom commercial : **OGIVE VXT**

Composition : **CLETHODIM 240 g/L**

N° AMM : **2200215**

Type d’action : **HERBICIDES**

Formulation : **(EC) CONCENTRE EMULSIONNABLE**

Conditionnement : **5L, 10L**

OGIVE VXT est une formulation dosant 240 g/l de cléthodime, substance active appartenant à la famille des cyclohexanediones, plus connue sous le vocable «dimes».OGIVE VXT est un anti-graminées foliaire utilisable dans de nombreuses cultures dicotylédones.Il se caractérise par un très large spectre tant sur graminées annuelles que vivaces et présente un bon niveau d’efficacité sur les adventices difficiles comme les ray-grass et les vulpins.Pour obtenir une bonne efficacité, il faut toujours l’associer à 1L d’huile végétale, intervenir du stade 3 feuilles à début tallage des graminées et traiter avec au moins 65% d’hygrométrie avec des températures comprises entre 8 et 25°C.

Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Arachide	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Avec adjuvant huileux Dose :						
Artichauts	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Artichaut porte-graine : Uniquement sur "artichaut". Efficacité montrée sur graminées annuelles. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur artichaut, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante						
Basilic	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d’utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave fourragère	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1,25 L/HA	1	60	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Betterave fourragère porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1,25 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur "betterave potagère" et "betterave industrielle et fourragère". Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Betterave industrielle	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1,25 L/HA	1	60	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Betterave industrielle porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1,25 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur "betterave potagère" et "betterave industrielle et fourragère". Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Betterave potagère	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1,25 L/HA	1	60	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Betterave potagère porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1,25 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur "betterave potagère" et "betterave industrielle et fourragère". Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur betterave à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Bourrache	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Bourrache	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Cameline	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Carotte	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Carotte porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur "carotte". Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Carthame des teinturiers	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Céleri	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Céleri rave	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Chanvre	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Chenevis	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Choux pommés	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	28	5 m
Usage : Uniquement sur choux pommés. Efficacité montrée sur graminées annuelles. Dose : Applications : Suite à une utilisation sur choux pommés, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Choux pommés	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur "choux pommés". Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Suite à une utilisation sur choux pommés, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Ciboulette	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Colza	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Courges à graines	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Estragon	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Fenouil	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Fétuque ovine porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Uniquement sur fétuque rouge et ovine. Stade d'application : à partir de BBCH 25 jusqu'au 1er octobre. Dose : Applications : Suite à une utilisation sur graminées fourragères et à gazons, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Fétuque rouge porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Uniquement sur fétuque rouge et ovine. Stade d'application : à partir de BBCH 25 jusqu'au 1er octobre. Dose : Applications : Suite à une utilisation sur graminées fourragères et à gazons, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Féverole de printemps	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps et féveroles de printemps. Dose :						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Fèves sèches	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose :						
Haricots frais écossés	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose :						
Haricots non écossés	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	30	5 m
Usage : Dose :						
Haricots non écossés frais	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose :						
Haricots secs	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose :						
Laurier	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Lavande	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN Dose :						
Lavande	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Lavandin	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN Dose :						
Lavandin	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : UNIQUEMENT SUR LAVANDE ET LAVANDIN						
Légumineuses fourragères	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	40	5 m
Usage : Dose :						
Légumineuses fourragères porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose :						
Légumineuses porte-graine	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur légumineuses potagères et pois écossés frais.						
Lin	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Lotier	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	40	5 m
Usage : Dose :						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Luzerne	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	40	5 m
Usage : Dose :						
Moutarde	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Navette	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	F	5 m
Usage : Dose : Applications : Suite à une utilisation sur crucifères oléagineuses d'hiver, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Onagre	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Panais	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Pavot	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Pavot oeillette	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Persil	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Persil à grosse racine	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Pois chiche	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose :						
Pois écossés frais	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose : Applications : Uniquement sur légumineuses potagères et pois écossés frais.						
Pois fourrager	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps et féveroles de printemps. Dose :						
Pois non écossés	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	30	5 m
Usage : Dose :						
Pois non écossés frais	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : Dose :						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Pois protéagineux de printemps	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur pois fourrager de printemps, pois protéagineux de printemps et féveroles de printemps. Dose :						
Pois sec	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur fèves sèches, haricots secs, pois secs et pois chiches. Dose :						
Raifort	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Ricin	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Romarin	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						
Sainfoin	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	40	5 m
Usage : Dose :						
Sauge sclarée	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	60	5 m
Usage : Uniquement sur ciboulette, persil, basilic, sauge, estragon, laurier, romarin, fenouil, céleri Dose :						

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

OGIVE VXT

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
Scorsonères	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Sésame	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	90	5 m
Usage : Dose :						
Tabac	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	NA	5 m
Usage : L'usage sur tabac est homologué mais non recommandé par Phyteurop. Dose :						
Topinambours	Désherbage	Graminées annuelles, Graminées vivaces	1 L/HA	1	40	5 m
Usage : Efficacité montrée sur graminées vivaces. Efficacité montrée sur graminées annuelles à la dose de 0,5 L/ha. Dose : Applications : Une application par cycle cultural et par parcelle. Suite à une utilisation sur carotte à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la cléthodime l'année suivante.						
Trèfle	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	40	5 m
Usage : Dose :						
Vesce	Désherbage	Graminées annuelles	0,5 L/HA	1	40	5 m
Usage : Dose :						

Description

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.

Informations réglementaires

Nom commercial : **OGIVE VXT**



Mention d'avertissement : **Danger**

Mention de danger :

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P261 Éviter de respirer les brouillards/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P331 NE PAS faire vomir.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISION ou un médecin
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans des sacs étanches conformément à la réglementation locale ou dans une installation d'élimination des déchets agréée.

SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Eviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]
SPe 1 Pour protéger les eaux souterraines, suite à une utilisation sur

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



	graminées fourragères et à gazons, « crucifères oléagineuses d'hiver », choux pommés, « carotte » à une dose supérieure à 0,5 L/ha, « betterave industrielle et fourragère » à une dose supérieure à 0,5 L/ha, et « betterave potagère » à une dose supérieure à 0,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cléthodime plus d'une année sur deux. **SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques , respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau. Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.**
DRE	**48h**
Détenteur homologation :	**VEXTACHEM s.r.l.**
Marque déposée :	**SIPCAM France**
Réglementation transport ADR :	**VOIR FDS**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

